



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°27 du 17/10/2001 - 2 pages

Colza

Stades : de 4-6 feuilles pour les levées tardives à 8-10 feuilles avec beaucoup de situations autour de 8 feuilles. Quelques débuts d'élongation sont visibles.

Ravageurs

Les conditions météorologiques restent favorables au vol des insectes. Le vol de **grosse altise** s'est stabilisé. Des captures de **charançons du bourgeon terminal** sont encore observées. Beaucoup des femelles capturées sont porteuses d'oeufs. Les piqûres et les dépôts d'oeufs restent cependant peu importants dans les parcelles observées (Athie (21) 2 % de pieds avec pontes, Binges (21) 4 % de pieds avec pontes et larves, Germigney (39) 8 % de pieds porteurs de larves), aucune ponte dans les autres situations.

Les **pucerons** se maintiennent ou sont en légère progression dans un certain nombre de situations.

■ *Pour les quelques situations à risque charançon important : parcelles peu avancées avec un niveau de captures soutenu et en secteur présentant une antériorité de dégâts de charançon du bourgeon terminal, la protection doit maintenant être réalisée*

rapidement si elle n'est pas encore intervenue.

Compte tenu du stade des cultures, l'intérêt d'une intervention anti-pucerons apparaît douteux.

Phoma

La présence de quelques macules est assez fréquente sur anciennes feuilles. Le suivi réalisé sur les pièges de Beaune et de Coulanges les Nevers a mis en évidence un début de projections depuis mi-septembre à Coulanges et fin septembre à Beaune. Ces projections ne sont jusqu'alors pas très importantes.

■ *Compte tenu des conditions de végétation actuelles, seules des situations très exceptionnelles pourraient justifier une protection.*


Céréales

Stades : de semis en cours à 2 voire 3 feuilles pour les premiers semis. Les levées sont rapides avec les températures actuelles.

Pucerons

Les conditions météorologiques sont favorables au vol. Les captures à la tour d'Auxerre (voir graphique ci-dessous) montrent une pro-

Captures hebdomadaires de *R. padi* à la tour d'Auxerre



Céréales

Observer les pucerons. Intervention sur parcelles à 2 feuilles présentant 10 % ou plus de pieds avec pucerons.

F256

D34° Jo 43156

Service Régional de la
Protection des Végétaux
ZI Nord - BP 177
21205 BEAUNE Cedex
Tél : 03.80.26.35.45
Fax : 03.80.22.63.85

Service Régional de la
Protection des Végétaux
Immeuble Orion
191, Rue de Belfort
25043 BESANCON Cedex
Tél : 03.81.47.75.70
Fax : 03.81.47.75.79

Imprimé à la station
D'Avertissements Agricoles
de Bourgogne
Directeur gérant : JC
RICHARD
Publication périodique
C.P.A.P n°1700 AD
ISSN n°0758-2374

Tarif Courrier et Fax : 380 F.

gression du vol. Les observations en culture révèlent la présence de nombreux pucerons ailés et une installation rapide des aptères sur les parcelles (non traitées Gaucho) à 1-2 feuilles. La fréquence de pieds porteurs de pucerons parfois nulle, se situe souvent entre 5 et 15-20 % pouvant atteindre ponctuellement 30 % en plaine de Chemin. Quelques pucerons sont parfois visibles sur des parcelles en cours de levée. La pression semble un peu moins marquée en secteurs plateaux (Châtillonnais, Tonnerrois) ainsi qu'en Séonnais et Gâtinais).

■ *Observez vos parcelles (le meilleur moment pour l'observation est un début d'après-midi ensoleillé).*

Dans les parcelles ayant atteint la 2ème feuille, en présence de pucerons sur 10 % des plantes, intervenir rapidement.

Pour toutes les autres situations, l'intervention est prématurée, attendre un prochain bulletin.

JNO - Résultats pots pièges - poste de Beaune

Période d'exposition	% de pots colonisés	% de plantes colonisées	Nbre de pucerons par pot	Nbre de pucerons par plante	% de pots infestés par le virus
14 au 21/09	0	0	0	0	0
21 au 28/09	13,8	3,3	0,26	0,1	2,5
28/09 au 05/10	45	13,1	1,03	0,2	5,0
05/10 au 12/10	61	16	2,6	0,3	Analyse en cours

Cicadelles

Les conditions actuelles sont également très propices à l'observation des cicadelles. Les niveaux de populations restent globalement moyens. Une activité localement importante est parfois signalée en secteurs sensibles.

■ *Pour les quelques situations à risque cica-*

delles, une intervention peut être envisagée dès la 1ère feuille.

Limaces

Elles restent très actives et appellent une intervention rapide en cas de présence importante.

*

*

*